



# HIOSCINA – IBUPROFENO

Comprimidos Recubiertos

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento:

¿Qué contiene BUSCAPINA® Fem?

Cada comprimido contiene:

Hioscina N-Butilbromuro..... 20 miligramos  
Ibuprofeno..... 400 miligramos

Los componentes inactivos son sílice coloidal, almidón de maíz pregelatinizado, almidón, talco, glicolato sódico de almidón y Opdry II 85 F púrpura.

**Acciones:**

Alivia los espasmos (contracciones musculares) generados en los órganos del abdomen y la pelvis, calmando el dolor y disminuyendo la inflamación.

¿Para qué se usa BUSCAPINA® Fem?

BUSCAPINA® Fem está indicado para el alivio de los espasmos dolorosos (cólicos o retortijones) del aparato digestivo, vías biliares y aparato genitourinario, incluidos los dolores menstruales.

¿Qué personas NO pueden recibir BUSCAPINA® Fem?

**NO USE** este medicamento si tiene:

- Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.
- Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad (asma, rinitis broncoespasmo, angioedema o picazón), asociadas con la toma de Ácido Acetil Salicílico u otros antiinflamatorios de la familia del ibuprofeno.
- Miastenia gravis (enfermedad de los músculos).
- Megacolon (enfermedad del intestino grueso).
- Insuficiencia hepática y/o renal (funcionamiento inadecuado de su hígado y -o riñones).
- Antecedentes de úlcera de estómago o intestino, sangrado o perforaciones en el aparato digestivo.
- Antecedentes de asma bronquial, pólipos nasales, (protuberancia que se proyecta hacia el interior de la nariz), angioedema (hinchazón de la cara, de la lengua o garganta), picazón o broncoespasmo inducido por fármacos de la familia del Ácido Acetil Salicílico y otros antiinflamatorios del grupo del ibuprofeno.
- Pérdida importante de líquido (vómitos, diarrea o tomar pocos líquidos),
- Insuficiencia del corazón grave.
- Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con diarrea y dolor abdominal)
- Aumento de la presión ocular (Glaucoma).
- Dificultad para orinar (por agrandamiento prostático) o defecar.
- Antecedentes de perforación o sangrado gastrointestinal, en relación con un tratamiento con antiinflamatorios.
- Sangrado activo cerebrovascular o de otro tipo.
- Alteraciones de la formación de sangre en estudio.
- Adolescentes con un peso corporal menor a 40 kg. Menores de 12 años de edad.
- Durante el tercer trimestre del embarazo.

SANOFI 

• Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted está tomando otros medicamentos para la inflamación y el dolor, (por ejemplo, aspirina) consulte con su médico antes de tomar BUSCAPINA® Fem.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la menor dosis efectiva que calme los síntomas, por el tiempo más corto.

Se debe administrar con precaución en personas con antecedentes de úlcera de estómago o intestino o enfermedad inflamatoria del intestino. Se debe interrumpir el tratamiento con BUSCAPINA® Fem en caso de aparecer signos de úlcera o sangrado.

Las personas de edad avanzada (mayores de 65 años) deben consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

Pacientes que se encuentren en tratamiento con otros antiinflamatorios (incluyendo aspirina) o Pacientes con alteraciones en la coagulación o en tratamiento con anticoagulantes deben consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

Pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas a otros medicamentos o con enfermedades en las vías aéreas, pueden tener mayor probabilidad de desarrollar una reacción de hipersensibilidad. Consulte con su médico antes de tomar Buscapina Fem.

Si usted presenta además de dolor de panza o dolor cólico, náuseas, vómitos, diarrea y/o fiebre, no tome ninguna medicación y consulte con su médico.

Si la persona que va a tomar la medicación tiene antecedentes de presión arterial alta, enfermedad del corazón y/o enfermedades cerebrovasculares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Se debe tener especial cuidado en personas con compromiso de la función renal (p. ej. personas deshidratadas, especialmente adolescentes, o personas de edad avanzada con compromiso de la función renal), especialmente al combinar otros medicamentos que pueden comprometerla.

Debe ser tomado con precaución en personas con taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca) u otros antecedentes de enfermedades del corazón.

Si consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Aunque el Ibuprofeno tiene a veces los mismos usos que la aspirina y el paracetamol, no deben ser tomados juntos excepto bajo supervisión médica.

Ibuprofeno puede ocultar los signos de una infección (fiebre, dolor, inflamación).

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor.

Si usted está tratando de concebir consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Si el dolor de panza o dolor cólico por el cual empezó a tomar esta medicación, continúa por más de 2 a 3 días, o empeora, por ejemplo con náuseas, vómitos o fiebre, descenso de la presión arterial, desmayos, o presencia de sangre en heces, consulte a su médico inmediatamente.

Si bien BUSCAPINA® Fem es generalmente muy bien tolerado pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo, por su contenido de Hioscina puede ocasionalmente producir sequedad de boca, aumento en la frecuencia cardíaca (taquicardia) y retención urinaria (dificultad para orinar).

Algunos efectos indeseables de este medicamento incluyen:

Alteraciones en la sangre (anemia, agranulocitosis).

Alteraciones del Sistema Nervioso (depresión, insomnio, nerviosismo, confusión, irritabilidad, mareos, fatiga, dolor de cabeza, reacciones psicóticas).

Alteraciones en la vista (problemas para enfocar la vista, visión borrosa, alteración de los colores), por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión, suspender la administración del fármaco y consultar con su oftalmólogo.

Alteraciones auditivas (disminución de la audición, zumbidos).

Alteraciones del corazón (aumento o disminución de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones).

Alteraciones gastrointestinales (úlceras, sangrados, vómitos o materia fecal con sangre, perforación, constipación, vómitos, diarrea, boca seca).

Alteraciones del hígado (mal funcionamiento del hígado, aumento de las enzimas).

Alteraciones en la piel (erupciones en la piel, sudoración excesiva o sequedad y resquebrajamiento en las palmas y plantas).

Reacciones de hipersensibilidad, que en algunos casos podrían ser graves como el shock anafiláctico (sensación de desvanecimiento, náuseas, boca seca, falta de aire, palidez, sudoración).

Hinchazón de rostro, lengua o garganta. Si usted presenta alguna de estas reacciones, discontinue el tratamiento y consulte inmediatamente a su médico.

Alteraciones renales (mal funcionamiento de los riñones, dificultad para orinar, retención de líquidos).

Si se presentan algunos de los efectos indeseables mencionados, se debe discontinuar el tratamiento con BUSCAPINA® Fem.

Si está tomando algunos de estos medicamentos, consulte a su médico: analgésicos (ej. ácido acetilsalicílico), antiplaquetarios, antidepresivos, (ejemplo amitriptilina, imipramina, inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina, paroxetina), medicamentos para tratar la epilepsia (difenilhidantoina y fenitoína), tratamiento del trastorno bipolar, maniaco – depresivo (litio), antiviral (amantadina), medicación para las náuseas (metoclopramida), medicación para el asma (ejemplo salbutamol, clenbuterol, tiotropio, ipratropio), medicación para el corazón (quinidina, digoxina, antihipertensivos), anti diabéticos diuréticos, glucocorticoides, antialérgicos (por ejemplo loratadina, cetirizina); anticoagulantes orales (warfarina), metotrexato, tacrolimus (para trasplantes), zidovudina (para el HIV) Probenecid/sulfipirazona (medicamentos para la gota), antibióticos quinolónicos, ciclosporina.

Se debe tener precaución al manejar vehículos u operar maquinarias.

¿Cómo se usa BUSCAPINA® Fem?

Las personas adultas y los mayores de 12 años pueden tomar 1 comprimido 3 veces al día (cada 8 horas). Los comprimidos deben ser tragados enteros, sin masticar y pueden tomarse junto con las comidas o después de ellas, con abundante líquido (aproximadamente un vaso).

No tomar el medicamento por más de 5 días, si los síntomas persisten o empeoran por 48 horas, suspnda la medicación y consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más de la cantidad necesaria?

En caso de náuseas vómitos y diarrea, y dolor de panza, excitación, convulsiones o desvanecimiento, coloración azul de la piel y falta de aire, usted puede estar ante una sobredosis.

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de intoxicaciones:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez tel. (011) 4962-6666/2247,

Hospital Alejandro Posadas tel. (011) 4658-7777/4654-6648

y Centro de Asistencia Toxicológica La Plata tel. (0221) 451-5555.

Paraguay

Ante una eventualidad concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el Hospital de Emergencias Médicas - Centro Nacional de Toxicología - tel. 220-418. Gral. Santos y Teodoro Mangelos.

Uruguay

En caso de ingesta accidental o sobredosis, comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): Hospital de Clínicas Avenida Italia s/n piso 7 TEL: 1722.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

sanofi-aventis Argentina S.A. - Línea OTC al 0800 4444 682(OTC)

ANMAT Responde 0800 333 1234

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

**Modo de conservación:**

Conservar en su envase original y no almacenar a temperatura superior a 25 grados centígrados.

**PRESENTACION:**

Envases con 6 y 30 comprimidos recubiertos.

Elaborado en: Calle 8 entre 3 y 5 y calle 3 y del canal, Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

sanofi-aventis Argentina S.A. Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires  
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, Certificado N° 45.765,  
Dirección Técnica: Verónica N. Aguilar, Farmacéutica

Paraguay

Importado por Lab. Bagó del Paraguay S.A. - Av. España 1525- Reg. Q.F. Carolina Delgado- R.P. N°4.599.

Distribuido por: Intercom Farmacéutica S.A. - Tte. Rómulo Ríos - Depósito N° 6. Tel: 614.661. Venta. aut. por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Reg. Sanitario N°08575-03-EF. Venta Libre en Farmacias.

Uruguay

Representante e importador en Uruguay: sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edif. Corporate El Plata, F. García Cortinas 2357 piso 3

11300 - Montevideo, Reg. M.S.P. N° 36.369

Conservar a temperatura ambiente (15-30°C).

Venta bajo control médico recomendado.

Dirección Técnica: Q.F. María José Bocage

Fecha de última revisión de prospecto autorizado por ANMAT: 12/12/2016

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**